

2017 福建省高等职业教育入学考试

医药卫生类冲刺卷

(面向中职)

学校_____ 班级_____ 姓名_____ 座号_____ 成绩_____

(考试时间: 150 分钟 满分: 300 分)

一、单选题: (每题 3 分, 共 120 分)

1. 通过膈中心腱的结构是 ()
A. 主动脉 B. 食管 C. 迷走神经 D. 下腔静脉
2. 老年人骨易发生骨折的原因 ()
A. 有机质含量增多 B. 无机质含量增多 C. 骨松质较多 D. 骨密质较多
3. 关于髋关节的说法, 哪项是错误的 ()
A. 由髌臼和股骨头构成 B. 关节囊厚而紧张 C. 股骨颈被包在关节囊内 D. 囊的表面有韧带加强
4. 肛管粘膜与皮肤的分界标志是 ()
A. 白线 B. 肛梳 C. 直肠横襞 D. 齿状线
5. 回肠区别于空肠的主要特点是 ()
A. 位于左上腹部 B. 黏膜环状襞高而密 C. 管腔较小 D. 管壁较厚
6. 关于咽的说法错误的是 ()
A. 向前通口腔 B. 向前通气管 C. 全长可分为三部 D. 下续食管
7. 肺呼吸部是指 ()
A. 小支气管至肺泡 B. 呼吸性细支气管至肺泡 C. 肺泡管至肺泡 D. 终末细支气管至肺泡
8. 额窦开口于 ()
A. 上鼻道 B. 中鼻道 C. 下鼻道 D. 蝶筛隐窝
9. 肾皮质伸入肾髓质内的部分是 ()
A. 肾门 B. 肾窦 C. 肾蒂 D. 肾柱
10. 输尿管的第 2 狭窄处位于 ()
A. 平对肾的下端处 B. 穿膀胱壁处 C. 输尿管的起始处 D. 跨越髂血管处
11. 精子产生于 ()
A. 精曲小管 B. 睾丸间质 C. 精囊腺 D. 附睾管
12. 维持子宫前倾的结构是 ()
A. 子宫主韧带 B. 子宫圆韧带 C. 子宫骶韧带 D. 子宫阔韧带
13. 前尿道指的是 ()
A. 尿道前列腺部 B. 尿道海绵体部 C. 尿道膜部 D. 尿道内口

14. 看近物时,使晶状体变厚的主要原因是()
A. 睫状小带紧张 B. 睫状肌收缩 C. 晶状体具有弹性 D. 瞳孔括约肌收缩
15. 临床上常用作测脉搏的血管是()
A. 桡动脉 B. 尺动脉 C. 肱动脉 D. 股动脉
16. 右淋巴导管注入()
A. 左静脉角 B. 右静脉角 C. 左颈内静脉 D. 右颈内静脉
17. 关于主动脉的下列描述,哪项不正确()
A. 起自左心室 B. 全长可分为三段
C. 在第4 腰椎下缘平面分为左、右髂总动脉 D. 升主动脉无分支
18. 不属于心传导系的结构是()
A. 窦房结 B. 房室结 C. 房室束 D. 心房肌
19. 常用于压迫止血的动脉不包括()
A. 面动脉 B. 颞浅动脉 C. 足背动脉 D. 腋动脉
20. 躯干、四肢的痛、温度觉传导通路第二级神经元的细胞体位于()
A. 脊神经元 B. 脊髓后角 C. 楔束核、薄束核 D. 背侧丘脑
21. 支配舌肌的脑神经是()
A. 舌咽神经 B. 下颌神经 C. 舌下神经 D. 迷走神经
22. 临床上常把麻药注入哪个腔隙进行脊神经根阻滞麻醉()
A. 硬膜外隙 B. 蛛网膜下隙 C. 蛛网膜粒 D. 硬脑膜窦
23. 侏儒症是由于哪个腺体在幼年分泌功能不足造成的()
A. 垂体 B. 甲状腺 C. 肾上腺 D. 甲状旁腺
24. 单纯扩散和易化扩散的共同点是()
A. 借助于通道蛋白的帮助 B. 顺浓度差转运 C. 需要能量 D. 借助于载体蛋白的帮助
25. 内源性凝血和外源性凝血的根本区别是()
A. 前者发生在体内,后者发生在体外 B. 前者发生在血管内,后者发生在血管外
C. 前者只需体内因子,后者只需体外因子 D. 前者由XII因子启动,后者由III因子启动
26. 肝硬化晚期患者,抽血查肝功能:血浆白蛋白与球蛋白比值倒置,其血浆渗透压主要表现为()
A. 胶体渗透压降低 B. 晶体渗透压降低 C. 胶体渗透压升高 D. 晶体渗透压升高
27. 有关心输出量的描述,错误的是()
A. 每分输出量指每分左心室射入主动脉的血量 B. 心缩一次所射出的血量叫每搏输出量
C. 每分输出量是指每搏输出量和心率的乘积 D. 左、右心输出量基本相等
28. 药物过敏或细菌毒素引起的血压下降的最初因素是()
A. 输出量减少 B. 外周阻力降低 C. 全身小血管扩张 D. 循环血量减少
29. 调节心血管活动的基本中枢位于()
A. 脊髓 B. 延髓 C. 脑桥 D. 中脑

30. 血中 H^+ 浓度升高使呼吸运动增强, 主要通过刺激下列哪个部位而实现 ()
- A. 延髓呼吸中枢 B. 颈动脉窦和主动脉弓 C. 中枢化学感受器 D. 颈动脉体和主动脉体
31. 正常成人第一秒末用力呼气量约占肺活量的 ()
- A. 60% B. 70% C. 75% D. 83%
32. 胃特有的运动是 ()
- A. 分节运动 B. 容受性舒张 C. 紧张性收缩 D. 蠕动
33. 体温调节的基本中枢位于 ()
- A. 脊髓 B. 中脑 C. 延髓 D. 视前区-下丘脑前部
34. 重吸收能力最强的部位是 ()
- A. 近端小管 B. 髓袢降支 C. 髓袢升支 D. 远曲小管
35. 直接影响远曲小管和集合管重吸收水的因素是 ()
- A. 醛固酮 B. 血管紧张素 II C. 血管升压素 D. 肾素
36. 肾小球滤过率是指单位时间 (每分钟) 内 ()
- A. 两侧肾生成的超滤液量 B. 每侧肾生成的超滤液量
C. 两侧肾生成的血浆流量 D. 两侧肾生成的终尿量
37. 视觉器官中可调节眼折光力的是 ()
- A. 角膜 B. 房水 C. 晶状体 D. 玻璃体 E. 虹膜
38. 有关内脏痛的特征, 错误的是 ()
- A. 较缓慢, 持续时间长 B. 定位不精确, 对刺激分辨力差
C. 切割与烧灼内脏均可引起剧烈疼痛 D. 常伴有牵涉痛
39. 下列哪种激素与血钙浓度有关 ()
- A. 甲状旁腺素 B. 甲状腺素 C. 醛固酮 D. 肾上腺素
40. 以下不是胆碱能纤维作用的是 () ;
- A. 能使汗腺分泌 B. 能使骨骼肌收缩 C. 能使瞳孔缩小 D. 能使心脏活动加强

二、是非判断题: (每题 2 分, 共 30 分)

1. 胆囊底体表投影在右锁骨中线与右肋弓下缘交点处, 胆囊出现病变时, 此处有明显压痛。()
2. 胸骨角平对第三肋, 体表易摸到, 为计数肋的标志。()
3. 上颌窦的窦口位置高于窦底, 故上颌窦的慢性炎症较多见。()
4. 膀胱底在女性则与子宫颈和阴道相邻。()
5. 男性尿道的耻骨前弯此弯曲是恒定的。()
6. 黄斑的中央凹是感光 and 辨色最敏锐的部位。()
7. 右心房有 2 个入口: 分别是上腔静脉口, 下腔静脉口。()
8. 食管癌和胃癌病人会引起左锁骨上淋巴结肿大。()
9. 脑和脊髓的被膜有三层由外至内为软膜、蛛网膜、硬膜。()
10. 肾上腺实质由皮质和髓质构成。()

11. 体液调节是人体功能活动的主要调节方式。()
12. 血清与血浆的主要区别是前者不含纤维蛋白。()
13. 二尖瓣听诊区在左侧第 5 肋间锁骨中线稍内侧。()
14. 当血液中 Hb 含量超过 50g/L 时, 则皮肤、黏膜呈暗紫色, 这种现象称为发绀。()
15. 基础代谢率的测定是临床上诊断甲状腺疾病的重要辅助手段。()

三、填空: (每格 2 分, 共 60 分)

1. 食管上端与_____相接, 下端连于胃的_____。
2. 人体直立时, 胸膜腔的最低位置是_____, 它是_____和_____转折处形成的半环形间隙。
3. 膀胱的形态分为_____, _____、_____和膀胱颈。
4. 输卵管结扎的部位在_____; 受精的部位在_____。
5. 眼球的屈光系统包括_____, _____、_____和角膜。
6. 肝门静脉系借_____, _____和_____等与上、下腔静脉系之间存在多处吻合, 当肝门静脉血液受阻时, 可经此形成侧支循环。
7. 大脑皮质的躯体运动区位于_____和_____。
8. 甲状腺由左、右两个_____和中间的_____组成。
9. 心律加快时, 心动周期将_____, 其中以_____期更显著。
10. 肺通气的直接动力是_____与_____之间的压力差。
11. 机体安静时主要的产热器官是_____, 机体散热的主要器官是_____。
12. 肾小球滤过作用的动力是_____, 用公式表示 = _____ - (_____ + 肾小囊内压)。
13. 迷走神经兴奋时, 胰岛素分泌_____。

四、名词解释: (每题 6 分, 共 30 分)

1. 麦氏点:

2. 动脉韧带

3. 白质

4. 中心静脉压

5. 激素

五、论述题：（每题 10 分，共 60 分）

1. 简述肝的位置、形态、分部及体表投影。

2. 简述心的位置、形态。

3. 试述脑脊液的产生及循环途径。

4. 动脉血压是怎样形成的?受那些因素的影响?

5. 试述胆汁的主要成分及其生理作用。

6. 试述牵张反射的概念, 分类及各有何生理意义?